

MEMOIRES
DE LA
SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
DU DOUBS

QUATRIÈME SÉRIE
NEUVIÈME VOLUME

1874



BESANÇON
IMPRIMERIE DODIVERS ET C^{ie},
Grande-Rue, 87.

—
1875

LISTE
DES
MOLLUSQUES FOSSILES

DU GAULT DE MORTEAU (Doubs)

Par M. G. BERTHELIN

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE.

Séance du 14 février 1874.

Dans une excursion faite il y a plusieurs années aux environs de Morteau, j'ai eu occasion de visiter des exploitations de sables et d'argiles du Gault, situées au lieu dit « sur la Seigne. » J'ai l'honneur de présenter à la Société d'Emulation une liste des fossiles que j'y ai recueillis : elle est sans doute susceptible d'être fort augmentée ; mais elle pourra donner une idée de la richesse extrême de cette remarquable localité, où j'ai pu, en une couple d'heures, réunir plus de soixante-dix espèces différentes. Plusieurs, qui sont certainement nouvelles, ne sont qu'indiquées ici, en attendant qu'il me soit possible d'en publier une description.

La principale exploitation m'a offert une coupe dont voici la nomenclature :

1° et 2° Cailloux roulés du diluvium, surmontés par la terre végétale ;

3° Sable rougeâtre ;

4° Sable vert clair ;

5° Sable jaunâtre ;

6° Sable verdâtre.

Le sable jaunâtre renferme de nombreux nodules noirâtres très durs, entièrement pétris de fossiles, à l'état de moules

intérieurs et d'empreintes extérieures fort nettes. Ces nodules se retrouvent aussi dans les couches 3, 4 et 6, comme le montre la coupe. De plus, la couche 4 contient quelques rognons de sable aggloméré d'un vert clair, comme celui qui les entoure. Les argiles ne se voient pas dans cette coupe; mais on en pouvait présumer l'existence au-dessous du sable 6, à la présence de l'eau accumulée au fond de la sablière : elles affleuraient plus bas, à quelque distance.

Les fossiles des nodules noirâtres sont, comme il est dit ci-dessus, à l'état de moules et d'empreintes; ceux du sable, à l'état de moules intérieurs, sauf les huîtres, les plicatules et les brachiopodes; ceux des argiles, en moules de limonite de fer.

LISTE DES FOSSILES (1).

Ammonites	Mammillaris, Schl., sables, a. c.	Natica sp., sables et nodules, r.
—	Parandieri, d'Orb., argiles, r.	Avellana subincrassata, d'Orb., sables, r. r.
—	Milletianus, d'Orb., sables et nodules, a. c.	Scalaria Clementina, d'Orb., sables et nodules, a. c.
—	splendens? Sow. argiles, r.	— gaultina, d'Orb., sab., r. r.
—	Beudanti. Brgn., argiles, a. c.	Ringinella lacryma, d'Orb., nodules, a. r.
—	versicostatus, Michel, sables, r.	Acteon. Deux espèces, r. r.
Quatre autres espèces.		Turritella.
Delucii, Brgn., argiles, a. r.		Vibrayesiana? d'Orb., nodules, r. r.
Lyellii, Leym., sables, r.		Rostellaria carinella? d'Orb., nodules, r. r.
Belemnites minimus, Lister, "sables, c.		— costata, Michel, argiles, sables, c.
Hamites. Deux espèces.		— sp., nodules, r. r.
Conoteuthis? Une espèce, arg., r. r.		Solarium subornatum, d'Orb., sables, r.
Natica Rauliniana, d'Orb., sables, a. c.		— dentatum? d'Orb., sabl., r.
— gaultina, d'Orb., sables, c.		— moniliferum, Michel, sables, r.

(1) Les lettres c, a c, r, a r, etc., veulent dire commun, assez commun, rare, assez rare, etc.

Turbo sp., nodules, r. r.	Pectunculus sp., nodules, r. r.
Cerithium subspinosum, Desh., argiles, a. c.	Arca Hugardiana, d'Orb., nod., r.
Dentalium sp., c.	— carinata, Sow., nodules, a. r.
Panopæa plicata, d'Orb., sables, a. r.	— Campicheana, Pict. et Roux, nodules, r.
Arcopagia Rauliniana, d'Orb., nodules, a. r.	— Cottaldina, d'Orb., nodules r.
Leda Mariæ, d'Orb., nodules, a. c.	— bipartita (1), Pict. et Roux, nodules, r. r.
— subrecurva, d'Orb., nodules, a. c.	— fibrosa, d'Orb., sables et nodules, a. r.
— sp., nodules, a. r.	— subnana, Pict. et Roux, nod., r. r.
Venus Vibrayesiana, d'Orb., sables, r.	Lima parallela, d'Orb., nodules, r.
Thetis Genevensis, Pict. et Roux, nodules, r. r.	Gervillia alpina, Pict. et Roux, nodules, r. r.
Trigonia rugosa? Ag., nodul., c. c.	Inoceramus concentricus, Park., sabl. et nod., c. c.
— Archiaciana, d'Orb., nodules, a. r.	— Salomoni, d'Orb., sables, r. r.
Cyprina Ervyensis, d'Orb., nodules, r.	Pecten Dutemplei, d'Orb., sables, r. r.
Cardita Constantii, d'Orb., sabl., c.	Janira albensis, d'Orb., nodules, a. r.
— exaltata? d'Orb., nodules, r.	Spondylus sp., nodules, r. r.
Corbula socialis, d'Orb., argiles, c. c.	Plicatula radiola, Lamk., sabl., c. c.
Lucina. Deux espèces.	Ostrea arduennensis, d'Orb., sables et nodules, c. c.
Cardium Raulinianum, d'Orb., nodules, r. r.	— canaliculata, d'Orb., sables, a. c.
— sp., nodules, r. r.	Rhynchonella sulcata, d'Orb., sables et nod., a. r.
Nucula albensis, d'Orb., nod., r.	— lata, d'Orb., s abl., r.
— pectinata, Sow., nodules, a. r.	Terebratula Dutempleana, d'Orb., sables, a. c.
Pectunculus alternatus, d'Orb., nodules, c. c.	

Je me bornerai, en ce qui concerne les caractères de cette faune, à faire remarquer la présence des espèces suivantes, qui appartiennent spécialement au Gault de la Porte-du-Rhône et de la Suisse :

(1) Ce nom a déjà été employé par ROEMER, *Nord. ool.*, p. 102, pl. 14, f. 12.

Thetis Genevensis;

Arca Campicheana ;

— *bipartita* ;

— *subnana* ;

Gervillia alpina.

C'est aux géologues qui peuvent s'occuper de cette étude, de rechercher jusqu'où s'étendent les relations zoologiques entre le Gault du Jura français et celui du bassin du Rhône.

Courtenot, 20 octobre 1873.
